

Deficitul de hormon de creștere la copiii din România

SANDOZ A Novartis Division

Deficitul de hormon de creștere la copii reprezintă o situație medicală complexă care se manifestă diferit de la pacient la pacient. Prezența unei întârzieri de creștere care nu este diagnosticată și tratată corespunzător poate avea efecte negative asupra sănătății fizice și mai ales mintale a copilului.



Date conform unui studiu Ipsos, realizat la nivel național pe 500 de părinți și 100 de medici

Subdiagnosticare și nevoia de mai multe informații despre această afecțiune



2 din 5

părinți nu știu despre existența unui tratament pentru tulburările endocrine care cauzează deficit de creștere la copii.



Doar 1 din 3

medici consideră că diagnosticul de deficit de creștere îi îngrijorează foarte mult pe părinți.



1 din 2

părinți nu cunoaște detalii despre graficele de creștere pentru copii.



Majoritatea medicilor spun că deficitul de creștere la copii este subdiagnosticat și că părinții ar avea nevoie de mai multe informații despre această afecțiune.

Impactul pandemiei asupra diagnosticării

55%



dintre părinți estimează că în timpul perioadei de pandemie numărul consultațiilor la medic pentru evaluare generală sau control a scăzut.

50%



din medici au confirmat o scădere a numărului de vizite la medic, în cazul copiilor cu vârsta de până la 12 luni.



Majoritatea medicilor au confirmat scăderea numărului de vizite în cazul copiilor mai mari.



3 din 4

medici declară că în perioada pandemiei, părinții preferă metodele de consultații alternative (telemedicina) astfel încât mulți dintre medici nu văd copilul în cabinet și nu au posibilitatea să facă măsurători.

Prevenție și diagnosticare



Efectuarea constantă a măsurătorilor poate contribui semnificativ la diagnosticarea precoce a copiilor cu deficit de hormon de creștere.



Tratamentul corespunzător este esențial pentru atingerea obiectivului terapeutic și creșterea calității vieții copiilor.



Rolul medicilor de familie și al medicilor pediatri este esențial pentru un diagnostic stabilit cât mai devreme și pentru indicarea tratamentului adecvat de către medicul endocrinolog.



Părinții au un rol important în acest demers - se recomandă măsurarea copilului, cel puțin o dată la 6 luni și prezentarea la medic atunci când aceștia observă o stagnare sau întârziere a creșterii copilului.

Surse:

• Studiu Ipsos realizat pe un eșantion de 500 de părinți, în februarie 2021, la nivel național

• Studiu Ipsos realizat pe un eșantion de 100 de medici, în martie 2021, la nivel național